



Groupe de Cancérologie Cutanée

FICHE D'INFORMATION PATIENTS : Cemiplimab-Liptayo®

(Mise à jour : 2024)

De quel type de traitement s'agit-il ?

Le cemiplimab est une immunothérapie, qui stimule le système immunitaire, dans le but de l'éduquer à reconnaître, attaquer et détruire les cellules cancéreuses. En dermatologie, il est indiqué dans le traitement des carcinomes épidermoïdes avancés (non opérables ou métastatiques).

Quelles sont les modalités d'administration du traitement ?

Le cemiplimab est administré en hôpital de jour, par perfusion intraveineuse, toutes les 3 semaines. La durée de chaque perfusion est d'environ 30 minutes.

Vous devez réaliser un bilan sanguin avant chaque perfusion, selon l'ordonnance prescrite par votre dermatologue.

Quels sont les effets indésirables de ce traitement ? Que faire s'ils surviennent ?

Une activation excessive de votre système immunitaire peut engendrer des effets secondaires pouvant toucher tous les organes (notamment cutanés, pulmonaires, intestinaux, hépatiques, hormonaux, rénaux). La plupart apparaissent pendant le traitement mais ils peuvent également apparaître après l'arrêt du cemiplimab. Il est important que vous connaissiez ces effets secondaires pour que vous puissiez avertir l'équipe soignante lors de leur survenue. L'équipe vous guidera alors dans la gestion de ces effets secondaires.

Effets indésirables	Conduite à tenir
Essoufflement, toux inhabituelle, douleur thoracique	Consulter votre médecin traitant et contacter le service.
Fatigue	Soyez à l'écoute de votre corps. Maintenez une activité physique, un sommeil suffisant de nuit et des temps de repos adaptés en journées. Informez votre médecin en cas de fatigue inhabituelle ou persistante.
Diarrhées fréquentes (souvent glairo-sanglantes), douleurs abdominales	En cas de diarrhées sous immunothérapie : Faire le bilan biologique de base, examen parasitologique des selles 3 jours de suite, coprocultures avec recherche de Clostridium difficile. Traitement symptomatique : Anti diarrhéique Smecta® (respecter un intervalle de 2h avec tout autre médicament et alimentation), Lopéramide (Imodium®). Bien s'hydrater (1,5l d'eau par jour). Si + de 4 selles/jour ou perte de poids de + de 2 kg, contacter votre médecin traitant ou le service. En cas de nausées ou vomissements sévères, contacter votre médecin traitant ou le service.
Perte d'appétit, perte de poids	Privilégier les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel ... Demander les conseils d'une diététicienne. Si perte de + 2 kg, contacter votre médecin traitant ou le service.
Problèmes du foie :	En cas de coloration jaune du blanc des yeux ou de la peau et/ou des urines foncées, contacter votre médecin traitant ou le service.
Problèmes cutanés : démangeaisons, éruption cutanée, sécheresse cutanée	Si éruption cutanée : plaques rouges, démangeaisons, gonflements, sensation de brûlures, cloques, ulcérations buccales ou dans d'autres muqueuses, contacter votre médecin traitant ou le service.

Douleurs musculaires, faiblesse musculaire, fourmillements	La chaleur (serviette chaude) peut vous apporter un soulagement local temporaire. Utiliser un antalgique (paracétamol) et consulter votre médecin traitant. Ne prenez pas d'anti-inflammatoires sans un avis médical. En cas de perte de force ou de troubles sensitifs des membres (fourmillements, décharges électriques, diminution de la sensibilité...), contacter votre médecin traitant ou le service.
Douleurs articulaires	Une activité physique douce et régulière permettra d'entretenir vos articulations et de diminuer la perception de la douleur au cours du temps. Si cela persiste ou devient trop gênant, en informer votre médecin.
Fièvre, sensation de malaise, changement du comportement	En cas de fièvre supérieure à 38°C ou de frissons, sensation de malaise inhabituelle, consulter votre médecin traitant.
Maux de tête inhabituels, nuque raide, confusion, convulsions	Contactez le service en urgence.
Diabète	Contactez le service si : sensation de soif inhabituelle, besoin d'uriner plus fréquent que d'habitude, faim excessive, sensation de fatigue, perte de poids.
Anomalies biologiques	Contactez le service si vous constatez des variations importantes sur votre prise de sang.

Autres informations concernant le traitement :

Informez votre médecin de tous vos antécédents médicaux, y compris les maladies auto-immunes, les infections chroniques, et les transplantations d'organes.

Il n'existe pas d'interaction médicamenteuse majeure avec le traitement ; cependant, il est indispensable de signaler à votre médecin tous les traitements que vous prenez y compris les nouveaux traitements (et traitements sans prescription : probiotiques, vitamines...).

Il est possible de vous faire vacciner normalement.

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace et ne pas allaiter pendant le traitement par le cemiplimab et au moins 4 mois après la dernière dose de cemiplimab.

Il n'existe pas de donnée clinique sur les effets possibles de l'utilisation du cemiplimab sur la fertilité. En fonction de votre situation, une consultation dédiée pourra vous être proposée dans un centre spécialisé.

Quelles sont les modalités de surveillance de ce traitement ?

Un bilan sanguin est réalisé avant chaque perfusion. Lors de votre venue en hôpital de jour, un examen clinique est réalisé par le médecin. Le plus souvent, un bilan d'imagerie de réévaluation est réalisé tous les trois mois. Les modalités d'imagerie sont adaptées au cas par cas selon les patients (IRM, scanner, TEP scanner...). Les modalités d'arrêt du traitement sont discutées au cas par cas en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).